



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla  
Ravi 18, 10138 Tallinn  
Rg-kood 10822068  
Tel 666 1900  
E-post info@itk.ee  
www.itk.ee

## Рецидивирующая эрозия роговицы

Цель данного информационного листка – пояснить причины, признаки и возможности лечения рецидивирующей (повторной) эрозии роговицы.

### **Суть заболевания**

Рецидивирующая эрозия роговицы или отслоение эпителия – часто встречающееся глазное заболевание, которое может возникнуть через несколько месяцев или даже через несколько лет после повреждения или царапания роговицы. Речь идет о неполном посттравматическом заживлении, в результате чего на роговице остаются более свободные поверхностные клетки. Эти свободные клетки роговицы по утрам при моргании могут отслаиваться.

### **Признаки заболевания**

Признаки эрозии роговицы проявляются по утрам во время пробуждения ото сна. К ним относятся:

- сильная боль в глазу;
- покраснение;
- слезоточивость глаза;
- светобоязнь.



На картинке видно окрашивание эрозии роговицы красителем.

### **Лечение болезни**

Диагностикой и лечением заболевания занимается глазной врач. Диагноз можно поставить только после осмотра глаза с помощью микроскопа.

Сначала эрозию лечат глазными каплями или глазными мазями, содержащими антибиотики. Рекомендуется держать глаз закрытым, тогда трение при моргании не мешает заживлению эрозии.

Обычно эрозия излечивается за 2-3 дня. Чтобы избежать возобновления процесса эрозии, после выздоровления рекомендуется использовать препараты для увлажнения глаз. Поддержание влажности роговицы и внутренней поверхности века предотвращает вызываемое трением отслоение свободных клеток.

При наличии вопросов и за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к своему лечащему врачу или медсестре.

ITK667

Данный информационный материал согласован с Глазной клиникой 01.01.2023.