



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla  
Ravi 18, 10138 Tallinn  
Rg-kood 10822068  
Tel 666 1900  
E-post info@itk.ee  
www.itk.ee

## Конизация шейки матки под общей анестезией

Цель данного информационного листка - предоставить пациентке информацию о цели, характере, подготовке к конизации шейки матки, ходе операции и восстановлении после нее.

**Конизация шейки матки** – это хирургический метод лечения, в ходе которого с шейки матки удаляется конусообразный кусок ткани.

Цель конизации – вырезать с шейки матки зону с измененными клетками.

Конизацию шейки матки проводят тогда, когда у пациента диагностирована дисплазия шейки матки средней или тяжелой степени.

В случае дисплазии нарушается рост клеток. При умеренной степени дисплазии изменения захватывают до 2/3 толщины поверхностного эпителия шейки матки. При тяжелой степени дисплазии нарушается рост клеток всего поверхностного эпителия, однако измененные клетки не вторгаются в более глубокий базальный слой.

### **Перед операцией**

Для того, чтобы избежать рвоты и попадания рвотных масс в легкие, **за шесть часов до операции Вам нельзя есть, а также пить, по меньшей мере, за четыре часа до проведения операции.** Кроме того, **нельзя курить, жевать жевательную резинку.** Если Вы страдаете хроническим заболеванием (например, артериальной гипертонией или астмой), и Вам назначено лечение, то свои ежедневные лекарства следует принять также и утром в день операции. Для того чтобы проглотить таблетку, разрешается выпить пару глотков воды. Исключение составляют лишь диабетические лекарства, которые, как правило, натошак не принимают. Перед операцией опорожните мочевой пузырь.

Для того, чтобы снизить риск возникновения осложнений, просим Вас проинформировать врача:

- о состоянии своего здоровья, обо всех заболеваниях и постоянно принимаемых лекарственных средствах;
- о наличии у Вас кардиостимулятора.
- об аллергии на известные Вам лекарственные препараты;

### **Ход операции**

Конизацию шейки матки проводит врач-гинеколог, операцию проводят под общим обезболиванием. Для проведения конизации используется электрическая петля или скальпель. Конусообразный фрагмент шейки матки удаляется и направляется на дальнейшее гистологическое исследование.

### **Возможные осложнения**

В ходе операции могут возникнуть осложнения. Возможные осложнения:

- аллергические реакции на лекарственные препараты;
- кровотечение, которое может возникнуть непосредственно после конизации или по истечении 1-2 недель после операции.

Если для проведения операции используется электрическая петля, то в зоне приложения электрода может возникнуть повреждение кожи (шрам). Также может возникнуть вызванная электрическим током язва на слизистой оболочке влагалища и половых губах. В качестве позднего осложнения может образоваться свищ между мочевым пузырем и влагалищем или между влагалищем и прямой кишкой. Вышеперечисленные осложнения встречаются крайне редко.

### **После операции**

После операции Вы на несколько часов останетесь в больнице под наблюдением. После того как Вы проснетесь от наркоза и будет удалена венозная канюля, Вы можете покинуть больницу.

В течение 24 часов Вам нельзя управлять автотранспортом или выполнять работу, требующую быстрой реакции, потому что лекарства, используемые для анестезии, могут замедлить скорость реакции.

После конизации шейка матки заживает в течение пяти недель. В этот период могут появиться небольшая кровоточивость и выделения с неприятным запахом. Для заживления необходимо следовать следующим рекомендациям:

- В течение пяти недель запрещено вести половую жизнь, принимать ванну и плавать, потому что эти действия могут вызвать кровотечение или воспаление.
- Три недели следует воздерживаться от физических нагрузок и занятий спортом.
- В течение 4-6 недель не рекомендуется пользоваться влагалищными тампонами (в том числе и во время менструации) и вагинальными шариками.

Кровотечение после конизации чаще всего возникает на 6-14-й день после процедуры. Изредка после конизации может возникнуть также слабая боль в нижней части живота. Некоторые пациенты в первый день после конизации ощущают тянущую боль в нижней части живота.

**NB! Если у Вас возникнет обильное кровотечение, повышение температуры или сильная боль в нижней части живота, незамедлительно обратитесь в отделение неотложной помощи женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы (открыт круглосуточно).**

Если Вас не проинформировали иначе, то результаты исследования можно узнать у своего врача в женской консультации (в Восточно-Таллиннской центральной больнице).

С вопросами и за получением дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к своему лечащему врачу или к медсестре.

ITK718

Данный информационный материал утвержден комиссией по качеству медицинских услуг Восточно-Таллиннской центральной больницы 14.09.2022 (протокол №13-22).