

Kogu keha staatiline stsintigraafia ja/või SPET joodiga

Kontroll-uuringut teostatakse mitte varem kui 6 kuud peale kilpnäärme radiojoodravi teostamist.

Protseduur sisaldab arsti vastuvõttu, diagnostilises annuses radiojoodi kapsli manustamist ja 48 h tunni möödudes kogu keha skaneerimist ja kolmemõõtmelist SPET/KT salvestust kaela-rindkere piirkonnast eelnevalt läbiviidud radiojoodravi efektiivsuse hindamiseks.

Türeotropiiniga; Thyrogen[®]

Uuringule tulles tuleb eelnevalt pidada joodivaest dieeti 3 nädala jooksul. Enne uuringut ei ole vaja katkestada kilpnäärme hormooni türoksiini tarvitamist, vaid TSH stimulatsiooniks süstitakse lihasesse kahel radiojoodkapsli manustamisele eelneval päeval türeotropiini (rhTSH/Thyrogen). Kontroll-uuring toimub ambulatoorselt, patsienti haiglasse ei hospitaliseerita.

Türoksiini tarvitamise katkestamisega

Uuringule tulles peab olema katkestatud kilpnäärme hormooni türoksiini võtmine eelneva 4 nädala jooksul ning peetud joodivaest dieeti 3 nädala jooksul. Kontroll-uuring toimub ambulatoorselt, patsienti haiglasse ei hospitaliseerita.