

Vaskulaarne neuroloogia

Ajuverevoolu taastav (revaskulariseeriv) ravi, mille käigus lõhustatakse peaajuarteris olev tromb ehk trombolüüs. Enne protseduuri kasuks otsustamist kaalutakse näidustusi ja vastunäidustusi. Enamasti jõuab patsient trombolüüsi poole tunni jooksul pärast haiglasse saabumist.

Kui ajuveresoones on tuvastatud tromb, mis trombolüüsil ei lahustu, tehakse mehaaniline trombektoomia, mille käigus tõmmatakse spetsiaalsete sondide abil tromb ajuveresoonest välja. Lisaks ägeda insuldi ravile selgitame välja selle kordumise riski ja vajaduse korral teostame raviprotseduurid suurtel kaelaveresoontel, paigaldades kahjustatud veresoonde stendi või suunates patsiendi veresoontekirurgi juurde ahenenud ala väljalõikamiseks kirurgilisel meetodil. 80% meie patsientidest suunatakse taastusravisse või koju ja umbes 20% juhtudest õendus-hooldusosakonda.

Iseseisval vastuvõtul nõustab insuldiga patsiente insuldiõde, kes suhtleb nendega ühe aasta jooksul regulaarselt ja kutsub vajaduse korral neuroloogi korduval vastuvõttule. Meie patsientidega tegelevad eraldi veel neuropsühholoog, kliiniline psühholoog, logopeedid ja füsioterapeut.