



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Первичный иммунодефицит

При первичном иммунодефиците (ПИД) врожденный генетический дефект приводит к недостаточности или дисфункции некоторых частей иммунной системы. Это может принимать форму, например, инфекции, вызванной необычным возбудителем, с необычным течением или продолжительностью заболевания, либо частых рецидивирующих инфекций.

Наша цель — как можно более ранняя диагностика первичного иммунодефицита и комплексное лечение страдающих им пациентов. При лечении иммунодефицитов мы применяем современные методы диагностики и лечения, а в случае менее распространенных форм при необходимости привлекаем специалистов из-за пределов нашей больницы. С 2011 года Центр аллергологии и иммунологии является частью Глобальной сети центров иммунодефицита Фонда Джеффри Моделла

Рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по первичным иммунодефицитам, если у вас есть два или более из следующих признаков опасности:

- острое воспаление среднего уха четыре раза в год или чаще
- острый гайморит два раза в год или чаще
- два или больше месяца лечения антибиотиками без заметного результата
- воспаление легких два раза в год или чаще
- замедление роста и прибавки в весе у детей
- постоянные глубокие гнойные воспаления кожи или внутренних органов
- постоянная грибковая инфекция полости рта или кожи
- необходимость лечения внутривенными антибиотиками с целью контроля инфекций
- две или более инвазивные инфекции, в т. ч. септицемия
- случаи иммунодефицита в семье

Primaarse immuunpuudulikkuse 10 ohumärki

Kui Teil või kellelgi Teie tuttavatest esineb kaks või enam allpool toodud ohumärkidest, tuleks sellest kindlasti rääkida arstiga, et selgitada välja võimalik primaarse immuunpuudulikkuse olemasolu.



1 Neli või enam ägedat keskkõrvapõletikku aastas.



2 Kaks või enam ägedat põskkoopapõletikku aastas.



3 Kaks või enam kuud antibiootikumravi olulise efektitä.



4 Kaks või enam kopsupõletikku aastas.



5 Kasvu- ja kaaluübe puudulikkus lapsel.



6 Korduvad sügavad naha- või siseorganite mädapõletikud.



7 Pidev seeninfektsioon suus või nahal.



8 Infektsioonide kontrollimiseks vajalik ravi veenisistest antibiootikumidega.



9 Kaks või enam invasiivset infektsiooni, sealhulgas septitseemia.



10 Immuunpuudulikkuse esinemine perekonnas.

Primaarne immuunpuudulikkus (PID) esineb sagedamini kui arvatakse. Primaarse immuunpuudulikkuse erinevaid vorme esineb 1:500 inimese kohta. Primaarse immuunpuudulikkuse korral esinevad lastel ja täiskasvanutel korduvad ja halvasti ravile alluvad infektsioonid. Kui patsiendil esineb kaks või enam välja toodud ohumärki, soovitame konsulteerida primaarse immuunpuudulikkuse spetsialistiga (allergoloog-immunoloog).

jm Jeffrey Modell Foundation

Käesolevad ohumärgid on väljatöötanud Jeffrey Modell Foundation'i meditsiini õtiskogu.



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA



Услуги

[Прием генетика](#)