



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Статическая сцинтиграфия всего тела и/или SPET с йодом

Контрольное обследование проводится не ранее чем через 6 месяцев после проведения радиойодной терапии рака щитовидной железы.

Процедура включает прием у врача, принятие капсулы радиоактивного йода в диагностической дозировке, а спустя 48 часов — сканирование всего тела и трехмерная запись ОФЭКТ/КТ шейно-грудного отдела для оценки эффективности проведенной радиойодной терапии.

С тиротропином; Thyrogen®

Перед прохождением обследования необходимо предварительно в течение трех недель придерживаться диеты с низким содержанием йода. Перед обследованием не нужно прерывать употребление гормона щитовидной железы тироксина; в течение двух дней до приема капсулы радиоактивного йода для стимуляции ТТГ внутримышечно вводится тиреотропин (rhTSH/Thyrogen). Контрольное обследование проходит в амбулаторном порядке, класть пациента в больницу не требуется.

Отказ от приема тироксина

При поступлении на обследование следует прекратить прием тироксина, гормона щитовидной железы, в течение предыдущих 4 недель и соблюдать диету с низким содержанием йода в течение 3 недель. Контрольное обследование проводится амбулаторно, пациент не госпитализируется в стационар.