



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla  
Ravi 18, 10138 Tallinn  
Rg-kood 10822068  
Tel 666 1900  
E-post info@itk.ee  
www.itk.ee

## Вакцинация новорожденных

**Вакцинация детей, родившихся здоровыми, проводится в соответствии с национальным графиком иммунизации.**

Инъекция от туберкулеза производится в область верхней трети левого плеча. На месте прокола появляется небольшая шишка, которая исчезает через несколько минут. Вакцинация может привести к увеличению лимфатических узлов в подмышечной впадине, что является естественной реакцией и не требует лечения. Через 2-4 недели на месте инъекции образуется небольшой плотный узелок, а кожа становится красной и блестящей. На втором месяце жизни в области инъекции узелок приподнимается над кожей и может образоваться пузырек, заполненный светло-желтой жидкостью, из которого может выделяться немного гноя. Эти гнойные выделения не являются признаком инфекции и не требуют лечения, но место инъекции, то есть область этого пузырька должно быть чистым и сухим. Во время купания место инъекции можно сполоснуть, но не тереть. Пузырек заживет в течение нескольких недель и покроется корочкой, за это время корочка может сойти несколько раз, а сама область инъекции может окончательно зарубцеваться в течение 3-5 месяцев. В некоторых случаях отделение гноя не происходит, но пузырек может сохраняться в течение одного или нескольких месяцев.

Последующие прививки будут проводиться в центре семейной медицины в соответствии с графиком вакцинации в Эстонии. Важно придерживаться графика вакцинации, ведь так организм ребенка вырабатывает необходимую защиту против серьезных заболеваний. Если ребенок подвергнется воздействию возбудителя этого заболевания в более позднем возрасте, организм сможет защитить себя, не заболев. Вакцинация не проводится, если у младенца высокая температура, насморк, кашель или диарея, поскольку иммунная система его организма ослаблена. В течение двух дней после прививки ребенок может испытывать легкий дискомфорт, болезненность в месте укола или повышение температуры тела. Если состояние ребенка по-прежнему беспокоит родителей, следует проконсультироваться с врачом.

**Прививки делаются только с согласия родителей.**

**Дополнительная информация:**

[Детская вакцинация](#)

[График вакцинации младенцев в Эстонии](#)