

BENSODIASEPIINID URIINIS

Lühend	U-Bzd
Mõiste	Laialt levinud kesknärvisüsteemi pärssiva toimega retseptiravimite rühm. Rahustava, uimasust tekitava ja lihaseid lõdvestava mõju tõttu kasutatakse peamiselt tõsiste ärevus- ja unehäirete, võõrutusseisundite ning epilepsia korral. Põhjustavad kognitiivseid (nt mäluhäired, mõttetegevuse aeglustumine, õppimisvõime vähenemine) ja psühhomotoorseid häireid, mis väljenduvad reaktsioonikiiruse, tasakaalu ja koordineatsiooni halvenemisena.
Näidustused	▪ Bensodiasapiinide tarvitamise tuvastamine
Proovivõtu vahendid	Uriini proovitops või uriinikatsuti
Materjali säilivus ja transport	2–8 °C 48 h, –20 °C pikemaajaliselt
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Immuunkromatograafia (kiiruuring)
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne ▪ Bensodiasapiinide metaboliitide sisaldus uriinis ületab testi tundlikkuse piiri NB! Juriidilistel näidustustel tehtud analüüsi positiivne tulemus vajab kinnitamist GC-MS või LC-MS meetodil Negatiivne ▪ Uriinis ei leidu bensodiasapiinide metaboliite ▪ Bensodiasapiinide metaboliitide sisaldus uriinis ei ületa testi tundlikkuse piiri
Hinnakirja koodid	66141
Kirjandus	• Kiirtesti kasutusjuhend: nal von minden Drug-Screen® Single/Multi Test (Urine) Rev.1.00 2023-12-12 • UpToDate Benzodiazepine poisoning 2025-02 • https://www.narko.ee/ained/bensodiasapiinid/
Koostaja	Piret Kedars