

Nakkustekitajate uuringud

| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus | Lühend | Referentsväärtused | | | Ühik |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------|------------|------|
| | | | Vanus | Sugu | Väärtus | |
| | B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis | S-HBs Ab QN | kõik | M/N | <10 | IU/L |
| | B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis | S-HBsAg | kõik | M/N | <0,9 | COI |
| | B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis | S-HBc Ab | kõik | M/N | >1,0 | COI |
| | <i>Bordetella pertussis</i> vastase IgA hulk seerumis/plasmas | S,P-B <i>pertussis</i> IgA QN | kõik | M/N | <12 | kU/L |
| | <i>Bordetella pertussis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-B <i>pertussis</i> IgG QN | kõik | M/N | <50 | kU/L |
| | <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B <i>burgdorferi</i> IgG conf | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B <i>burgdorferi</i> IgM conf | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-C <i>trachomatis</i> IgA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Chlamydia trachomatis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-C <i>trachomatis</i> IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Clostridioides difficile</i> DNA paneel roojas | St-C <i>difficile</i> tox | kõik | M/N | negatiivne | |
| | E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-HEV IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerimis/plasmas | S,P-HEV IgM | kõik | M/N | negatiivne | |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus | Lühend | Referentsväärtused | | | Ühik |
|------------------------------------|---|---|--------------------|------|------------|------|
| | | | Vanus | Sugu | Väärtus | |
| | Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) | S,P-EBV Ab panel | kõik | M/N | negatiivne | |
| Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) | A-gripi viiruse RNA | Influenza A virus RNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | B-gripi viiruse RNA | Influenza B virus RNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | RS-viiruse RNA | RS virus RNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Hantavirus IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-Hantavirus IgG conf | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Hantaviiruste vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-Hantavirus IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Helicobacter pylori</i> IgG seerumis/plasmas | S,P-H pylori IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | Hingamisteede viiruste ja bakterite DNA/RNA laiendatud paneel | XXX-RespVirBac RNA/DNA panel | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Hingamisteede viiruste RNA paneel | XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis | S-HIV1,2 Ag+Ab | kõik | M/N | <0,9 | COI |
| | Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring) | Cx-HPV NAT panel screen | kõik | N | negatiivne | |
| | Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis | S-HTLV1,2 Ab | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Kolmiktest (SARS-CoV-2, gripp A/B RNA) + RS-viiruse RNA | Kolmiktest (SARS-CoV-2, gripp A/B RNA) + RS-viiruse RNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Leetriveriiruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Measles virus IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Legionella pneumophila</i> antigeen uriinis | U-Lepn | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-HSV1,2 IgM | kõik | M/N | negatiivne | |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus | Lühend | Referentsväärtused | | | Ühik |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|------|------------|------|
| | | | Vanus | Sugu | Väärtus | |
| | Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-HSV1 IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-HSV2 IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris | CSF-Meningitis pathogen DNA/RNA panel | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade (RPR) tiiter seerumis/plasmas | S,P-RPRt | kõik | M/N | negatiivne | |
| MRSA (<i>S. aureus</i> DNA, mecA) ninakaapes | MRSA (mecA) | XXX-Meticillin (mecA) | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> DNA | XXX- <i>S aureus</i> DNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Mycobacterium tuberculosis</i> gamma-interferoon | P-M tuberculosis γ IFN | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgG QN | kõik | M/N | <20 | kU/L |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Parvovirus B19 IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-Parvovirus B19 IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-TBEV IgG QN | kõik | M/N | <120 | kU/L |
| | Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis | S,P-TBEV IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | RS-viiruse RNA | RS virus RNA | kõik | M/N | negatiivne | |
| | SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-SARS-CoV-2 IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes | Vag-GBS DNA | kõik | N | negatiivne | |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus | Lühend | Referentsväärtused | | | Ühik |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------|------------|------|
| | | | Vanus | Sugu | Väärtus | |
| | <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeen uriinis | U-Strepn | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-T <i>gondii</i> IgG | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-T <i>gondii</i> IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Treponema pallidum</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-T <i>pallidum</i> IgG conf | kõik | M/N | negatiivne | |
| | <i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad plasmas | P-T <i>pallidum</i> Ab | kõik | M/N | <1 | COI |
| | Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas | P-CMV IgG | kõik | M/N | <0,5 | kU/L |
| | Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas | P-CMV IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-VZV IgM | kõik | M/N | negatiivne | |
| | Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-VZV IgG QN | kõik | M/N | <50 | U/L |
| | C-hepatiidi viiruse vastased antikehad, antigeen seerumis/plasmas | S,P-HCV Ag+Ab | kõik | M/N | negatiivne | |