

KASVAJAANTIGEEN CA 15-3

Lühend	S,P-CA 15-3
Mõiste	Kasvajaantigeen, MUC-1 valguperekonda kuuluv glükoproteiin.
Näidustused	- Retsidiivi varajane avastamine varem ravitud II ja III staadiumi rinnavähi patsientidel - Abiuuring metastaseerunud rinnavähi ravi tulemuslikkuse hindamisel NB! Ei ole näidustatud kasvaja diagnoosimiseks ega asümptomaatilise patsiendi ravijärgseks jälgimiseks.
Proovivõtu vahendid	Geeli ja liitiumhepariiniga või geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti
Materjali säilivus ja transport	20–25 °C 2 päeva, 2–8 °C 5 päeva, –20 °C 3 kuud
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Meetod	Elektrokemoluminomeetria
Referentsvahemikud	< 26,2 kU/l
Tõlgendus CA 15-3↑	Ravitud patsiendil võib viidata rinnavähi retsidiivile või ebapiisavale raviefektile NB! Üksnes kasvajamarkeri muutust ei tohi kasutada ravimuudatuse tegemise põhjendusena.
Hinnakirja koodid	66707
Kirjandus	- Reagendi kasutusjuhend Roche Elecsys CA 15-3 II 2022-03, V 7.0 - Rifai, N. (2017). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 6th Edition: 436 - UpToDate: Approach to the patient following treatment for breast cancer 2025-03
Koostaja	Piret Kedars