

LSD URIINIS

Lühend	U-LSD
Mõiste	LSD ehk lüsergiinhappe dietüülamiid on sünteetiline väga tugeva toimega prototüüpne hallutsinogeen ja psühheedelikum. Algselt oli kasutusel anesteetikumina ja psühhoanalüüsi vahendina. Lisaks hallutsinatsioonidele põhjustab vererõhu ja kehatemperatuuri tõusu, pulsi kiirenemist, müdriaasi, iiveldust, oksendamist, meeleolu muutust, uimasust, letargiat, psühhoosi.
Näidustused	▪ LSD tarvitamise tuvastamine
Proovivõtu vahendid	Uriini proovitops või uriinikatsuti
Materjali säilivus ja transport	2–8 °C 48 h, –20 °C pikemaajaliselt
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Immuunkromatograafia (kiiruuring)
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne ▪ LSD sisaldus uriinis ületab testi tundlikkuse piiri NB! Juriidilistel näidustustel tehtud analüüsi positiivne tulemus vajab kinnitamist GC-MS või LC-MS meetodil Negatiivne ▪ Uriinis ei leidu LSD-d ▪ LSD sisaldus uriinis ei ületa testi tundlikkuse piiri
Hinnakirja koodid	66141
Kirjandus	• Kiirtesti kasutusjuhend: nal von minden Drug-Screen® Single/Multi Test (Urine) Rev.1.00 2023-12-12 • https://www.narko.ee/ained/lsd/ • UpToDate Intoxication from LSD and other common hallucinogens 2025-02
Koostaja	Piret Kedars